



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1052

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1767 di data 29 settembre 2023 - estensione dell'offerta gratuita dei vaccini anti- meningococco B e ACWY fino ai 25 anni.

Il giorno **12 Luglio 2024** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA  
ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

la Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 ha approvato il piano provinciale di promozione delle vaccinazioni, con il relativo calendario delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto, finalizzato, tra l'altro, a mantenere e sviluppare le attività di controllo delle malattie infettive prevenibili mediante le vaccinazioni, garantire alla popolazione l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni considerate prioritarie, raggiungere e mantenere la soglia del 95% delle coperture vaccinali, obiettivo percentuale raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per impedire la circolazione e la trasmissione degli agenti patogeni.

Nel corso degli anni, al fine di raggiungere l'obiettivo di sanità pubblica di diminuire e di eliminare le malattie infettive prevenibili mediante le vaccinazioni, la Giunta provinciale, acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive, istituita con deliberazione n. 811 di data 26 maggio 2014, con diversi provvedimenti ha aggiornato il calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto, da ultimo con deliberazione n. 1767 di data 29 settembre 2023.

A fronte delle valutazioni e degli approfondimenti circa gli andamenti delle patologie infettive e delle scelte intraprese anche a livello internazionale circa le misure atte a garantire e migliorare ulteriormente le strategie di prevenzione (come recentemente confermano i casi registrati) la Provincia autonoma di Trento ha richiesto alla Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive di valutare l'opportunità di incrementare l'offerta vaccinale a carico del Servizio sanitario provinciale. In base al vigente calendario vaccinale, i vaccini anti-meningococco B e ACWY sono offerti gratuitamente ai soggetti di età non superiore ai 18 anni e per gli stessi è prevista una chiamata attiva rispettivamente nel primo anno di vita e nel secondo e quindicesimo anno di vita.

Nel corso della riunione di data 15 maggio 2024, la Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive si è espressa in senso favorevole all'opportunità di estendere la gratuità dei vaccini anti-meningococco B e ACWY ai soggetti di età non superiore ai 25 anni.

Si propone, pertanto, di aggiornare il calendario provinciale delle vaccinazioni con la citata modifica al fine di offrire una migliore copertura alla popolazione e di prevenzione delle patologie infettive, e di aggiungere una chiamata attiva relativa al vaccino anti-meningococco B ai 15 anni di età.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento, mediante l'estensione dell'offerta gratuita dei vaccini anti-meningococco B e ACWY per i soggetti fino a 25 anni;
2. di dare atto che il calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012, così come modificato da ultimo con deliberazione n. 1767 di data 29 settembre 2023, è integrato con l'aggiornamento di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di integrare il calendario vaccinale con l'aggiornamento di cui al punto 1), e di aggiungere una chiamata attiva relativa al vaccino anti-meningococco B ai 15 anni di età;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall'aggiornamento del calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto di cui al punto 1) sono ricompresi nelle risorse di parte corrente, ripartite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2433 di data 21/12/2023, modificata con deliberazione n. 394 di data 28/03/2024, concernente il finanziamento del Servizio sanitario provinciale (SSP) per gli anni 2024-2026;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Calendario provinciale vaccinale

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## Calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza

VACCINO	ETA'											
	0-30 giorni	3° mese	4° mese	5° mese	6°-7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	6° anno	12° anno	15° anno	
<b>DTPa</b>		DTPa		DTPa		DTPa			DTPa <sup>(1)</sup>		dTpa <sup>(2)</sup>	
<b>IPV (Polio)</b>		IPV		IPV		IPV			IPV		IPV	
<b>EpB (Epatite B)</b>	EpB-1,2 <sup>(3)</sup>	EpB		EpB		EpB						
<b>Hib (Emofilo)</b>		Hib		Hib		Hib						
<b>PCV-15 (Pneumococco)</b>		PCV-15		PCV-15		PCV-15						
<b>Men B (meningococco B)</b>			Men B-1 <sup>(4)</sup>		Men B-2 <sup>(4)</sup>			Men B-3 <sup>(4)</sup>				
<b>MPRV</b>							MPRV-1 <sup>(5)</sup> oppure MPR				Var <sup>(7)</sup> oppure MPRV	
<b>MPR</b>									MPRV-1 <sup>(6)</sup>			
<b>VAR</b>								Var				
<b>Men ACWY (Meningococco ACWY)</b>							Men ACWY				Men ACWY	
<b>HPV</b>										HPV-1,2 <sup>(8)</sup>	HPV <sup>(9)</sup>	
<b>Rotavirus</b>		Rotavirus <sup>(10)</sup>		Rotavirus	Rotavirus							
<b>Epatite A</b>							Ciclo vaccinale a partire da 1 anno di età nei soggetti a rischio <sup>(11)</sup>					

### Interpretazioni delle età di offerta del calendario

**3° mese** si intende dal 61° giorno di vita

**6° anno** si intende da 5 anni e un giorno fino al 6° compleanno

**12° anno** si intende da 11 anni e 1 giorno fino al 12° compleanno

**15° anno** si intende da 14 anni e 1 giorno fino al 15° compleanno

**Legenda:**

DTPa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare

dTpa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti

IPV: vaccino antipolio inattivato

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b

PCV-15: vaccino antipneumococcico coniugato 15 valente

Men B: vaccino antimeningococcico B

MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

Var: vaccino antivariella

Men ACWY: vaccino antimeningococco tetravalente coniugato

HPV: vaccino antipapilloma virus

Rotavirus: vaccino contro i rotavirus

Epatite A: vaccino contro il virus dell'epatite A

**Note:**

- 1) Come dose di richiamo al 6° anno può essere utilizzato sia il vaccino combinato quadrivalente formulazione bambini (DTPa-IPV) sia il vaccino quadrivalente a ridotto contenuto di antigeni della difterite e pertosse (dTpa-IPV) il cui impiego è approvato in scheda tecnica a partire dai 4 anni di età. Dopo il compimento dei 7 anni viene utilizzato di norma un vaccino a ridotto contenuto di antigeni della difterite e pertosse (dTpa-IPV).
- 2) Come dose di richiamo al 15° anno viene utilizzato il vaccino quadrivalente dTpa-IPV. I successivi richiami verranno eseguiti ogni 10 anni utilizzando il vaccino dTpa.
- 3) Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche anti-epatite B, la prima dose di vaccino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni.
- 4) La somministrazione della prima dose di Men B è prevista a partire dalla 12<sup>a</sup> settimana di vita, a distanza di due settimane dalla prima dose IPV-DTPa-HBV-Hib; la seconda dose è prevista dopo 2 settimane dalla seconda dose di IPV-DTPa-HBV-Hib, a distanza di almeno 8 settimane dalla prima dose. Una dose booster è prevista al 15° mese. L'offerta della vaccinazione contro il meningococco B non deve essere motivo di ritardo o mancata effettuazione delle vaccinazioni IPV-DTPa-HBV-Hib, contro le malattie prioritarie.
- 5) La vaccinazione morbillo-parotite-rosolia-varicella può essere eseguita con vaccino tetravalente MPRV o con vaccino MPR e vaccino varicella monovalente. L'utilizzo del vaccino MPRV deve essere condiviso con i genitori attraverso un'adeguata informazione dato l'incremento del rischio relativo di convulsioni febbrili rispetto alla somministrazione di MPR+V specie per soggetti con storia familiare positiva, rischio che è tanto più contenuto quanto più precocemente è effettuata la vaccinazione.
- 6) Come seconda dose a completamento del ciclo vaccinale; in questa fascia d'età viene impiegato il vaccino combinato MPRV.
- 7) Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distanza di 1 mese l'una dall'altra. Ai soggetti anamnesticamente negativi per varicella e per almeno una infezione tra morbillo, parotite e rosolia, somministrare il vaccino MPRV.
- 8) La vaccinazione viene eseguita con vaccino HPV nona valente (contro i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) verso i ceppi oncogeni e i ceppi causa dei condilomi genitali.
- 9) Per incrementare le coperture vaccinali è opportuno il recupero dei giovani e delle giovani in questa fascia d'età (catch up) che non si sono vaccinati/e in precedenza.
- 10) La vaccinazione, somministrata per via orale, viene eseguita contemporaneamente alle altre vaccinazioni previste per l'età.
- 11) La vaccinazione è raccomandata ai contatti stretti di casi di malattia e ai bambini e adolescenti appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di esposizione al virus dell'epatite A (nomadi, famiglie provenienti da Paesi ad alta endemia per le quali siano prevedibili viaggi verso i Paesi d'origine).

## Calendario provinciale delle vaccinazioni degli adulti

Vaccino	18-49 anni	50 -64 anni	> 64 anni
<b>Influenza</b> <sup>(1)</sup>	1 dose/anno (categorie a rischio)		1 dose/anno
<b>Pneumococco</b> <sup>(2)</sup> (PCV-20)			1 dose
<b>Pneumococco</b> <sup>(3)</sup> (PCV-20+PPSV23)	1 dose (categorie a rischio)		
<b>Herpes Zoster</b> <sup>(4)</sup>	2 dosi (0,2-6 mesi) categorie a rischio		2 dosi (0,2-6 mesi)
<b>dT/dTpa</b> <sup>(5)</sup>	1 dose booster ogni 10 anni		
<b>EpA</b> (Epatite A) <sup>(6)</sup>	2 dosi (0, 6-12 mesi)		
<b>EpB</b> (Epatite B) <sup>(7)</sup>	3 dosi (0, 1, 6 mesi)		
<b>MPRV</b>	2 dosi (0,4-8 settimane)		
<b>VAR</b> (varicella) <sup>(8)</sup>	2 dosi (0,4-8 settimane)		
<b>MPR</b> <sup>(9)</sup>	2 dosi (0,4-8 settimane)		
<b>Men ACWY</b> <sup>(10)</sup> (Meningococco ACWY)	1 dose		
<b>Men B</b> <sup>(11)</sup> (Meningococco B)	2 dosi (0,2 mesi)		
<b>TBE</b> <sup>(12)</sup> (Meningo-encefalite da zecche)	3 dosi (0, 2, 12mesi)		
<b>HPV</b> <sup>(13)</sup>	3 dosi (0, 2, 6 mesi) fino a età massima prevista in scheda tecnica <sup>(12)</sup>		

### Legenda:

Influenza: vaccino contro l'influenza stagionale

PCV-20: vaccino antipneumococcico coniugato 20 valente

PPV23: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23valente

Herpes zoster: vaccino antiherpes Zoster

dt/dTpa: vaccino antidiftto-tetanico per adulti/antidiftto-tetanico-pertossico acellulare per adulti

Epatite A: vaccino contro il virus dell'epatite A

Epatite B: vaccino contro il virus dell'epatite B

MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella

VAR: vaccino antivaricella

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

Men ACWY: vaccino antimeningococco tetravalente coniugato

Men B: vaccino antimeningococcico B

TBE: vaccino antimeningoencefalite da zecche

HPV: vaccino antipapilloma virus

### Note:

1) Raccomandata alle categorie di soggetti individuati dalla Giunta Provinciale.

2) Raccomandata per i soggetti di età > 65 anni.

3) Raccomandata per i soggetti a partire dai 18 anni a rischio di malattia invasiva, per gli ospiti di RSA.

- 4) Raccomandata per soggetti con diabete mellito complicato, con patologia cardiovascolare (classe NYHA  $\geq 3$ ), con BP-COe asma severo (FEV1 60%-80%), con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, per soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva tra cui rientrano i soggetti immunodepressi per immunodeficienza primaria (difetti dell'immunità innata: deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), i soggetti immunodepressi per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e i soggetti immunodepressi per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; per soggetti con immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapeutico, trapianto di cellule staminali o di organo solido, malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), malattie immuno-reumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.
- 5) Raccomandata agli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria (3 dosi a 0, 1, 6 mesi), un richiamo di vaccino dT o dTpa ogni 10 anni.
- 6) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali
- 7) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali
- 8) Nei soggetti a rischio di complicanze, anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati
- 9) Nei soggetti non precedentemente vaccinati
- 10) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva
- 11) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva
- 12) Raccomandata per i soggetti residenti in aree a rischio e professionalmente esposti
- 13) Vaccino nonavalente (contro i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) verso i ceppi oncogeni e i ceppi causa dei condilomi genitali offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche o comportamentali.

## **MODALITA' DI OFFERTA VACCINALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE**

Le vaccinazioni inserite nel calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza sono offerte attivamente e a titolo gratuito dai servizi vaccinali dell'Azienda provinciale ai soggetti iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario. Le stesse vaccinazioni sono offerte gratuitamente anche ai bambini e adolescenti presenti nel territorio provinciale anche se non iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario. Per chi non si vaccina al momento della chiamata viene mantenuto il diritto alla gratuità in caso di adesione ritardata sia per le vaccinazioni non obbligatorie pediatriche e dell'adolescenza almeno fino ai 18 anni compresi, sia per quelle dell'adulto nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto-RCP" di ogni specifico vaccino.

Le vaccinazioni effettuate ai viaggiatori che si recano all'estero per missioni umanitarie, missioni di pace, volontariato e motivi di adozione sono gratuite.

Nel caso di richieste di vaccinazioni in fasce d'età diverse da quelle previste dal calendario si adottano le modalità indicate di seguito.

- IPV, DTPa/dTpa, dTpaIPV, MPR e VAR: l'immunizzazione primaria ed eventuali richiami, sono sempre effettuati gratuitamente dai Servizi vaccinali, anche dopo il compimento del 18° anno d'età.

-Epatite B: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni e per i soggetti a rischio mai vaccinati.

- Hib: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da emofilo.

- Pneumococco. PCV: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni.



PCV-20: offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Nei soggetti a rischio di malattia invasiva da pneumococco a partire dai 18 anni la vaccinazione con PCV-20 è offerta gratuitamente ed è seguita, a distanza di almeno 8 settimane, dalla vaccinazione con PPSV23. La gratuità permane anche per tale vaccino.

- Herpes zoster: offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Inoltre, offerta gratuita per i soggetti di età superiore ai 18 con le seguenti condizioni di rischio: diabete mellito complicato, patologia cardiovascolare (classe NYHA  $\geq 3$ ), BPCO e asma severo (FEV1 60%-80%), recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, immunodeficienza congenita/acquisita compresi i soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Tra i soggetti immunodepressi rientrano le seguenti condizioni: immunodeficienza primaria per difetti dell'immunità innata (deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapeutico, per trapianto di cellule staminali o di organo solido, per malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), per malattie immuno-reumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), per infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.

- Men B: offerta gratuita per i soggetti fino a 25 anni; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco. Inoltre, qualora la situazione epidemiologica provinciale lo richiedesse, l'offerta per età può essere integrata.

- MenACWY: offerta gratuita per i soggetti nel secondo anno di vita e a partire dal compimento del 12° anno di vita fino ai 25 anni sia per gli adolescenti mai vaccinati in precedenza sia per quelli già immunizzati nell'infanzia; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco.

- HPV (virus del papilloma umano): offerta gratuita, per ambo i sessi, fino al compimento del 26° anno d'età; dopo tale età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per le persone affette da HIV; per altri soggetti a rischio elevato di infezione che si rivolgono all'ambulatorio IST (omosessuali e soggetti con numerosi partner sessuali); per le donne che hanno subito trattamenti per lesioni HPV correlate fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso.

- Epatite A: offerta gratuita alle persone che hanno avuto contatti stretti con un caso di epatite A; ai soggetti della fascia d'età 1-18 anni appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di esposizione al virus dell'epatite A (nomadi, famiglie provenienti da Paesi ad alta endemia per le quali siano prevedibili viaggi verso i Paesi di origine), agli emofiliaci, ai detenuti, agli epatopatici cronici e ai tossicodipendenti che fanno uso di droghe iniettabili; ad altri soggetti a rischio elevato di infezione che si rivolgono all'ambulatorio IST (omosessuali e soggetti con numerosi partner sessuali).

-TBE: l'offerta gratuita del vaccino contro l'encefalite da zecche a tutti gli iscritti al Servizio sanitario provinciale.